

DB1507

呼 伦 贝 尔 市 地 方 标 准

DB1507/T 26—2020

三河马种公马饲养管理技术规程

Technical Specification for Feeding and Management of Sanhe Horses
Stallion

地方标准信息服务平台

2020-05-12 发布

2020-08-12 实施

呼伦贝尔市市场监督管理局 发布

前 言

本标准依据GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由呼伦贝尔市农牧业局提出并归口。

本标准起草单位：呼伦贝尔市畜牧工作站、鄂温克旗畜牧工作站、鄂温克旗科兴马业发展有限公司。

本标准主要起草人：王景顺、葛根、罗保华、吕潇潇、娜荷芽、金伟、安乐、慕红军、多乐、格格、吉亚、苏霞、巴特尔、包柏、郭建军。

地方标准信息服务平台

三河马种公马饲养管理技术规程

1 范围

本标准规定了三河马种公马饲养管理的术语和定义、非配种期的饲养、配种前期的饲养和配种期饲养。

本标准适用于呼伦贝尔市三河马种马场、三河马配种站及三河马繁育场的种公马饲养管理。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

三河马种公马 Sanhe horse stallion

符合三河马品种标准，具有种用价值的成年公马，健康，无遗传病，不应有已发布的动物防疫法中所明确的二类疫病中的任何一种。

2.2

小群配种种公马 stallion in the groupuscule

采用小群自然交配的指定种公马。

2.3

采精种公马 stallion for semen collection

采用人工授精技术配种的种公马。

2.4

非配种期 off-breeding season

种公马每年不参与配种的时期，为期六个半月到七个月。

2.5

配种前期 previous breeding season

种公马由非配种期到配种期的过渡时期，为期一个半月到两个月。

2.6

配种期 breeding season

种公马每年参与配种的时期，为期三个半月。

3 非配种期的饲养

3.1 小群配种种公马

3.1.1 八、九月份，昼夜放牧，不补饲。

3.1.2 十月份至次年二月中旬，白天放牧，夜间补饲 15 kg 干草，补饲 2 kg~3 kg 燕麦。

3.1.3 每天保证两次饮水。

3.2 采精种公马

3.2.1 膘情保持在八成。

3.2.2 八、九月份青草饲喂量不变。

3.2.3 十月份至次年二月份青干草饲喂量保持不变。

3.2.4 食盐较配种期减半，以 400 kg 种公马计算，食盐量为 0.025 kg。

3.2.5 停喂鸡蛋、牛奶、胡萝卜。

3.2.6 加大运动量，每天以 1 h~2 h 为宜，应在宽敞的运动场使种公马自由活动。

3.2.7 每天保证两次饮水。

3.3 辅助措施

应在十月份进行一次驱虫，一次检疫和一次削蹄。

4 配种前期的饲养

4.1 小群配种种公马

4.1.1 种公马膘情应达到八成至九成。

4.1.2 应逐渐增加干草。循序渐进补充蛋白营养、胡萝卜、大麦芽及微量元素。日粮配比见表 1。

表1 小群配种种公马配种前期日粮表

单位：kg

饲料种类	饲喂量
青干草	16
豆饼	1.5
燕麦/粉碎大麦	3
胡萝卜	1.5~2
大麦芽	0.5~1
食盐	0.05

- 4.1.3 对于不脱毛的公马每天饲喂 0.5 kg 小米，直至完全脱去冬毛。
- 4.1.4 三月十五日至三月末，应固定配种小群。期间，继续单独补饲。
- 4.1.5 应控制运动量。
- 4.1.6 每天两次饮水。

4.2 采精种公马

- 4.2.1 种公马膘情应达到八成至九成。
- 4.2.2 逐渐增加干草。循序渐进补充蛋白营养、胡萝卜、大麦芽及微量元素。日粮配比见表 2。

表2 采精种公马配种前期日粮表

单位：kg

饲料种类	青干草	豆饼	燕麦/ 粉碎大麦	麸皮	胡萝卜	大麦芽	鸡蛋	食盐
饲喂量	16	1.0	2.5	1~1.5	1.5~2	0.5~1	0.2	0.05

- 4.2.3 种公马的运动量每天 40 min，运动方式以慢步为主，结合少量快步为宜。
- 4.2.4 每天三次饮水。

4.3 辅助措施

- 4.3.1 三月份，应进行驱虫一次，一次检疫和一次修蹄。
- 4.3.2 采精种公马，应试采精检测精液质量，检验饲养效果。

5 配种期的饲养

5.1 小群配种种公马

- 5.1.1 与配种小群，实行昼夜放牧。
- 5.1.2 补饲蛋白质及微量元素，饲喂量如配种前期相同，应在群牧地点单独补饲。
- 5.1.3 不补充干草和胡萝卜。
- 5.1.4 每日两次饮水。

5.2 采精种公马

- 5.2.1 配种期的饲养与配种前期相同，饲喂量及方法不变。
- 5.2.2 青草出来后，青草与干草的交替需要循序渐进。
- 5.2.3 每日饮水两次。
- 5.2.4 每日上下午各一次运动，每次运动 1 h。
- 5.2.5 应将种公马放入运动马圈，使其自由运动。
- 5.2.6 应及时清洁生殖器官，轻擦公马的精囊。
- 5.2.7 清洗按摩睾丸，促进精子的生成。
- 5.2.8 前后两次采精之间的要有足够的时间间隔，连续几天采精中间应安排一天休息时间。
- 5.2.9 配种期种公马的日程管理见表 3。

表3 采精种公马配种期日程管理表

项目	时间
饮水、饲喂	5: 00~6: 00
清扫马厩、测温	6: 00~7: 00
运动（可放入运动场）	7: 00~8: 00
日光浴、刷拭、护理	8: 00~10: 00
饮水、饲喂	10: 00 ~11: 30
午休	11: 30 ~14: 00
运动	14: 00 ~15: 00
休息	15: 00 ~ 17: 00
采精	17: 00 ~18: 00
饮水、饲喂	18: 00 ~19: 00
休息	19: 00 ~21: 00
投草	21: 00 ~ 21: 30
休息	21: 30 ~ 5: 00

地方标准信息服务平台